

ZAHNUNFALL

Zahnunfälle passieren beim Sport, in der Freizeit oder zuhause. Junge Menschen sind besonders betroffen. Werden Zahnunfälle richtig erkannt und behandelt, können auch schwer verletzte Zähne häufig erhalten werden. Gelingt dies nicht, kann ein Zahnunfall im Kindesalter hohe Folgekosten verursachen – unter Umständen ein Leben lang. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie man sich nach einem Zahnunfall richtig verhält.

- 1 Ruhe bewahren – Zahnerhalt ist meistens möglich, wenn Sie richtig handeln. Kontaktieren Sie Ihren Hauszahnarzt – bei jedem Zahnunfall. An Wochenenden und Feiertagen kontaktieren Sie den Zahnärztlichen Notfalldienst: www.lzg.li.
- 2 Was ist passiert, wann, wie, wo? Alter des Kindes/Jugendlichen? Sind Milch- oder bleibende Zähne betroffen?
- 3 Bei offenen Wunden ist möglicherweise eine Wundstarrkrampf-Impfung notwendig. Starke Blutungen durch Anpressen eines Stofftuches oder Verbandes stoppen. Bei Zeichen einer Hirnerschütterung (Schwindel, Erbrechen, usw.) sofort mit Hausarzt oder Spital Kontakt aufnehmen.
- 4 Informieren Sie die verantwortliche Versicherung und verlangen Sie ein Zahnschadenformular.



abgebrochen

Milchzähne – Behandlung ist dringend.

Bei kleineren abgebrochenen Stücken innert Tagen, bei Blutung aus dem Zahn am selben Tag, zum Zahnarzt.

Bleibende Zähne – Behandlung ist dringend.

Je mehr abgebrochen, desto dringender ist die Behandlung (innert Stunden). Grosse abgebrochene Stücke mitnehmen (können eventuell angeklebt werden).



herausgeschlagen

Milchzähne – Behandlung ist nicht dringend.

Meist ist es nicht sinnvoll, ausgeschlagene Milchzähne wieder einzusetzen.

Bleibende Zähne – Behandlung ist dringend.

Wenn möglich sofort wieder einsetzen. Sonst sofortiger Transport zum Zahnarzt. Die Wurzel des Zahnes nicht anfassen, reinigen oder desinfizieren. Bei sichtbarer Verschmutzung kurz unter fließendem Wasser abspülen.



verschoben

Milchzähne – Behandlung ist dringend.

Möglichst sofort zum Zahnarzt, damit der Zahn allenfalls an seinen richtigen Platz gedrückt werden kann (nur am selben Tag möglich).

Bleibende Zähne – Behandlung ist dringend.

Der Zahn muss an seinen Platz gedrückt und dort mit einer Schiene fixiert werden (innert Stunden).



geloockert

Milchzähne – Behandlung ist nicht dringend.

Zahnarzt innert Tagen konsultieren.

Bleibende Zähne – Behandlung ist dringend.

Der Zahn muss evtl. an seinem Platz mit einer Schiene fixiert werden (innert Stunden).



hineingeschlagen

Milchzähne – Behandlung ist nicht dringend.

Eine Behandlung ist selten nötig, dennoch ist es empfehlenswert, den Zahnarzt zu kontaktieren.

Bleibende Zähne – Behandlung ist dringend.

Der Zahn muss an seinen richtigen Platz gebracht werden. Höchste Gefahr für Komplikationen.